



DATE 10.03.2025\_v08  
UPDATE A/0125  
CODE —  
PRODUCT Etichetta  
Linea FORTECID TAC SPRAY ULTRA 150 ml  
DIMENSIONS 163 x 85 mm  
LAETUS N. —  
DIE CUT N. —  
FONT SIZE —



Impianto di proprietà Formevet Srl - Vietata la manomissione

cod. 159182 | **SDP** PREFRABA | gdp.it

**Avvertenze - Attenzione.** Manipolare il recipiente con cautela - Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne - Evitare di inalare direttamente il preparato o di spruzzarlo negli occhi - Non impiegare in quantità eccessiva o impropria - Se il preparato viene impiegato dove si soggiorna lungamente o nelle camere da letto, aereare sufficientemente il locale prima di soggiornarvi nuovamente - Allontanare gli eventuali animali domestici prima del trattamento - Non impiegare in agricoltura. **Informazioni per il medico** - Azione farmacodinamica del p.a.: agisce sul sistema nervoso causando uno stato di ipereccitabilità che può condurre alla completa paralisi. Tale azione è ridotta nei mammiferi. Consultare un centro antiveleni.

**Caratteristiche e campi d'impiego - TAC SPRAY® ULTRA** è un insetticida pronto all'uso dotato di una rapida azione abbattente. È utilissimo per combattere **insetti volanti** (zanzare, zanzara tigre, mosche, vespe), **insetti striscianti** (formiche, scarafaggi), **ragni** e **cimice verde**. Trova pertanto utile impiego negli ambienti domestici. **TAC SPRAY® ULTRA** può essere efficacemente impiegato in magazzini, depositi di merci alimentari, ambienti industriali in genere, abitazioni, cantine, scuole, asili, palestre, spogliatoi, caserme, cinema, teatri, sale d'attesa di stazioni ed aeroporti, mezzi di trasporto, villaggi turistici, campeggi, mense, alberghi, ristoranti, ospedali, case di cura, case di riposo ed in tutti quegli ambienti dove si renda necessaria una disinfestazione.

**Dosi e modalità d'impiego - TAC SPRAY® ULTRA** è destinato all'impiego in ambienti chiusi. Non trattare materiali o tessuti che verranno in contatto diretto con le persone. Se necessario ripetere il trattamento in funzione dell'infestante, del suo ciclo di sviluppo e delle condizioni ambientali. **Per la confezione da 150 ml (autosvuotante):** allontanare persone ed animali dall'ambiente da trattare e, dopo aver chiuso porte e finestre, posizionare l'erogatore verticalmente al centro dell'ambiente. Premere la valvola erogatrice e uscire dal locale. L'erogazione si completa in circa 2-3 minuti. Dopo 4 ore aereare gli ambienti trattati. La bombola

da 150 ml deve essere utilizzata in ambienti di circa 80 m<sup>3</sup> per trattamenti contro gli insetti volanti e di circa 45 m<sup>3</sup> contro gli insetti striscianti, i ragni e la cimice verde. Nel caso si rendesse necessario trattare ambienti con superfici e cubatura superiori, aumentare proporzionalmente il numero degli erogatori suddividendoli in più punti. **Avvertenze** - Nelle confezioni mantenute integre e nelle normali condizioni di temperatura, il preparato conserva inalterate le sue caratteristiche per almeno 24 mesi.

**CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - DA NON VENDERSI SFUSO - NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE**

**Bombola:** acciaio Fe 40 — **Tappo:** plastica PP 5  
Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune.



A0125



Linea  
**FORTECID®**

**VOLANTI** INSETTICIDA  
**STRISCANTI RAGNI** AUTOSVUOTANTE



**TAC SPRAY®**  
**ULTRA**

**AEROSOL**  
**INSETTICIDA PER INSETTI**  
**VOLANTI E STRISCANTI ED ALTRI**  
**ARTROPODI COME I RAGNI**  
**PER USO DOMESTICO E CIVILE**

**TAC SPRAY® ULTRA** UFI: K8HA-80GF-M006-AE3U

**Composizione** - 100 grammi di prodotto contengono Deltametrina (CAS 52918-63-5) 0,0222 g; Pralletrina (CAS 23031-36-9) 0,14 g; Piperonil butossido (CAS 51-03-6) 0,94 g; Coformulanti q.b. a 100 g  
**Contiene: Idrocarburi, C11-C13, isocalcani, <2% aromatici, acetato di etile, acetato di isoamile**

**Indicazioni di pericolo** - Aerosol estremamente infiammabile. - Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato. - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

**Consigli di Prudenza** - In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. - Tenere fuori dalla portata dei bambini. - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. - Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. - Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. - Non disperdere nell'ambiente. - NON provocare il vomito. - Raccogliere il materiale fuoriuscito. - Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F. - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale.

**Titolare della Registrazione:** BLEU LINE S.r.l. Via Virgilio, 28 - Z.I. Villanova - 47122 Forlì (FC) - Tel 0543 754430 - [bleuline@bleuline.it](mailto:bleuline@bleuline.it) - **Officina di Produzione:** BM S.r.l. Via Santa Maria del Monte, 522-550 - 47835 Saludecio (RN) - **Distribuito da:** FORMEVET S.r.l. Via Savona, 97 - 20144 Milano - Tel. 02 4345891 - [vetline@formevet.it](mailto:vetline@formevet.it) **Presidio Medico-Chirurgico - Registrazione del Ministero della Salute n. 21024**  
Partita n./del: vedi timbro

**Validità:** 2 anni  
**Contenuto netto:** 150 ml



**PERICOLO**



**210e3**